


بدون تشخیص علت درگیری ، درمان قطعی
بیماری امکان پذیر نمی باشد.



آمادگیهای قبل از بیوپسی چیست؟

بیمار عزیز شما در بخش بستری می شوید،
فشارخون شما کنترل می شود و داروهای
رقیق کننده خون آسپرین، پلاویکس و وارفارین
از چند روز قبل از بیوپسی قطع می شود
تست های تشخیصی جهت بررسی عملکرد
کلیه، آزمایش ادرار، تست های انعقادی و
سونوگرافی کلیه ها انجام می شود

بیوپسی (نمونه برداری) کلیه چیست؟



نمونه برداری روش تشخیص مهمی برای
شناسایی علت بیماری کلیه است که با
برداشتن نمونه کوچکی از کلیه از راه پوست،
توسط سوزن با کمک سونوگرافی انجام می
شود بررسی نمونه زیرمیکروسکوپ تاحد زیادی
به تشخیص علت بیماری کلیه کمک می کند و



بیوپسی (نمونه برداری) کلیه

تهیه وتنظیم: ژيلا کاملی زاده
کارشناسی ارشد پرستاری


مرکز آموزشی درمانی ولایت

بخش اورولوژی

پزشك دلايل انجام بيوپسي و راههاي
تشخيصي جاگزين و عواقب عدم انجام نمونه
برداري را به شما شرح مي دهد.

نمونه برداري چگونه انجام مي شود؟

قبل از انجام بيوپسي كليه از دست شما ورید
محيطي با آنژیوكت گرفته مي شود، سپس به
اتاق انجام نمونه برداري منتقل مي شويد
شما روي برانكارد برروي شكم دراز مي كشيد
و بالشي زير شكمتان قرار مي گيرد (درصورت
نمونه برداري از كليه پيوندي به پشت دراز مي
كشيد)



و پس از تعيين محل كليه با سونوگرافي،
پوست محل نمونه گيري استريل و با آمپول
ليدوكائين به صورت موضعي بي حس مي
شود نمونه گيري توسط سوزن اتوماتيك انجام
مي شود. براي بدست آوردن نمونه مناسب
ممکن است اين کار چند نوبت تکرار شود بعد
از نمونه برداري، شما بايد تا دو ساعت در همان
حالت روي برانكارد بي حرکت بمانيد.

مراقبتهاي پس از انجام بيوپسي چيست؟

تا صبح روز بعد از نمونه برداري درحالت
استراحت كامل در تخت بمانيد تا علائم حياتي
شما به صورت منظم كنترل شود. پس از انجام
سونوگرافي درصورت عدم وجودعارضه اجازه
فعاليت خارج از تخت توسط پزشك به شما داده
مي شود تا دو هفته بعد از انجام نمونه برداري
بايد از انجام فعاليت هاي سنگين (ورزش هاي
رزمي، برداشتن بارسنگين و ...) خوداري كنيد.

آدرس:

قزوین-کوی الهیه-میدان تعاون-مرکز آموزشی درمانی ولایت